

01

PDNA

Polinukleotid

Polinukleotidi iz DNK lososa koriste se širom sveta u različite medicinske svrhe.

To je bezbedan oblik nukleotida, stabilan na toploti, jer je uzet iz sperme lososa i u velikom procentu je kompatibilan sa humanom DNK.

Primena za tretman kože

Nukleotidi grade „zid“ od vaše DNK koji pruža zaštitu, poboljšava mikrocirkulaciju i igra važnu ulogu u stimulaciji faktora rasta.

SiiLK PDNA Platinum sadrži izuzetno prečišćen PDNA u formi polinukleotida, omogućava regeneraciju ćelija kože, zarastanje rana i saniranje oštećenja u ćelijama, popravku tkiva i deluje protivupalno. Zahvaljujući moćnim terapijskim dejstvima na kožu, polinukleotid iz DNK lososa koristi se za lečenje nepravilnosti, ožiljaka i ožiljaka od akni, bora, pigmentacije i strija, sa izuzetno zadovoljavajućim rezultatima.

02

GLUTATION

Glutation je veoma moćan antioksidant.

Glutation ima izuzetnu sposobnost sprečavanja oštećenja važnih ćelijskih komponenti usled dejstva slobodnih radikala, zagadjenja, teških matala i drugih nepovoljnih faktora.

Takođe efikasno deluje protiv starenja time što smanjuje bore, popravljajući teksturu kože, smanjuje upale i vrši detoksikaciju kože.

Glutation pretvara eumelanin (tamniji pigment) u feomelanin (svetliji pigment) i deaktivira enzim Tirozinazu, koji je zadužen za melanogenezu (proizvodnju pigmenta), dajući efekat posvetljivanja kože i čineći da koža deluje svetlije.

To je derivat aminokiseline Lizin, koji pruža moćno i specifično protivupalno delovanje, inhibira enzim tirozinazu u sintezi melanocita.

Njene najvažnije prednosti uključuju izbeljivanje poboljšanje tena kože i doprinos smanjenju ožiljaka.

Traneksaminska kiselina takođe podržava i pojačava dejstvo ostalih sastojaka, što pojačava njihovo dejstvo i daje bolje rezultate.

03

TRANEKSAMINSKA

Kiselina

04

HIJALURONSKA

Kiselina

Hijaluronska kiselina (HA) ima jedinstveno svojstvo zadržavanja vode. Može da privuče i zadrži do 1000 puta sopstvene težine vode, čime doprinosi da koža ostane hidrirana i jedra. Sposobnost privlačenja vlage iz okruženja povećava hidriranost svih tipova kože, što HA čini korisnom za popravku dehidrirane kože, bez obzira na tip i stanje kože.

HA takođe održava elastičnost kože, daje koži volumen, deluje kao barijera na koži i poboljšava stanje nesavršenosti.

Peptidi su nizovi aminokiselina koji su veoma prisutni u našoj koži, grade ćelije kože, ulaze u sastav proteina, uključujući kolagen i elastin.

Smanjenjem količine peptida, koža deluje oštećeno, suvo, gubi elastičnost i snagu, pokazuje znakove starenja, bore i gubitak volumena.

Primena peptida u kožu pomaže koži da obnovi strukturu kože i popravi oštećene ćelije kože. Takođe šalje signal koži da treba da proizvodi više kolagena i usporava proces starenja.

05

PEPTIDI





AMBALAŽA

3 ml x 5 bočica

SASTAV

PDNA (polinukleotid) 4 mg/ml
Glutation 2 mg/ml
Traneksaminska kiselina 2 mg/ml
Neukrštena HA (hijaluronska kiselina) 5 mg/ml
Peptidi sa faktorima rasta

PREDNOSTI

- Restrukturiranje kože
- Popravka oštećenja na koži
- Pобољшanje bora i velikih pora
- Smanjenje ožiljaka i strija
- Izbeljivanje kože
- Pобољшanje cirkulacije krvi
- Hidratacija kože
- Pospešuje vlažnost i elastičnost
- Pобољшава tonus i teksturu kože
- Moćna zaštita od oksidanata i starenja

DOZIRANJE I PROTOKOL

Sloj bazalnog epidermisa do dubokog dermisa.

Može se aplikovati ručno (primenom tehnike Nappage mezoterapije) ili pomoću Derma rolera, MTS ili drugog injektora. Najmanje 5 puta ponoviti intenzivnu proceduru (u intervalima od po 2 do 3 nedelje) za bolje rezultate.

Velike površine (celo lice, vrat ili telo):

1–2 bočice po 1 području primene ili neophodna doza prema veličini područja. Raširiti rastvor ravnomerno po čitavom području, ponoviti proceduru u oštećenijim područjima kao što su ožiljci, bore, pigmentacija itd.

Na mestu nedostatka (pigmentacije, ožiljka itd.):

0,5–2 ml po području, u zavisnosti od veličine područja, 0,01–0,02 ml po tački ubrizgavanja.

OPREZ

Čuvati na hladnijoj sobnoj temperaturi.

Izbegavati izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti.

Ne koristiti preostali proizvod.

Izbegavati šminku i kozmetiku najmanje 3 dana.

Nakon procedure izbegavati proizvode koji služe za eksfolijaciju ili konsultovati dermatologa pre upotrebe.

U slučaju neželjenih nuspojava, obustaviti primenu i odmah pozvati dermatologa.



Siilk PDNA PLATINUM

PDNA (polinukleotid) | Glutation | Traneksaminska kiselina |
Hijaluronska kiselina | Peptidi